

FESTUCA BARIANE



Suavidad de hojas de Bariane y Barolex

La festuca alta es una hierba ampliamente utilizada debido a su flexibilidad de adaptación y su producción de verano. Ahora hay una nueva generación de festucas de hojas suaves y tiernas.

La siguiente imagen muestra claramente la diferencia entre una festuca alta suave de hojas y una festuca alta tradicional como Kentucky-31 o Fawn. Las hojas de Kentucky-31 son anchas, abiertas, ásperas y verticales. En **Bariane o Barolex** las hojas son finas, suaves y muy densas. Esta foto fue tomada después de 5 meses desde la siembra.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Las grandes diferencias de Bariane contra Fawn

Bariane

- pradera densa
- hojas finas
- hojas suaves
- mayor crecimiento horizontal
- espigado tardío
- endófito libre
- hierba de alta calidad
- muy persistente
- alta palatabilidad
- resistente a roya

Fawn

- pradera abierta
- hojas anchas
- hojas ásperas
- mayor crecimiento vertical
- espigado temprano
- endófito infectada
- hierba de baja calidad
- menor persistencia
- baja palatabilidad (muy áspera al animal)
- susceptibles a la roya

FESTUCA BARIANE

Sabor agradable (Palatabilidad y apetencia)



La palatabilidad es difícil de medir, pero sí sabemos unas cuantas cosas. En un ensayo llevado a cabo en pastoreo de ovejas en Francia, **Bariane y Barolex** fueron las dos variedades preferidas de los animales. Las ovejas se comen la **Bariane** y **Barolex** antes de empezar a pastar las variedades de hojas ásperas como Fawn.

La fecha de espigado tardía de Bariane y barolex

Las variedades con fechas de espigado tardías son mucho más fáciles de manejar.

Estas variedades tardías producen menos espigas y más tarde, permitiendo un pastoreo más prolongado en el tiempo de pastoreo antes del invierno, lo que es una gran ventaja productiva.

Las variedades de maduración más tardía también se muestran menos propensas a re-espigados en verano. **Bariane y Barolex** se consideran variedades de maduración tardía, y **Bariane** es la variedad más tardía disponible en el mercado hoy.

Bariane produce semillas más de 10 días más tarde que la mayoría de las otras variedades.

